RMC CLINIC
Общество с ограниченной ответственностью"ЭрЭмСи клиника"
Юридический адрес: 620110 г. Екатеринбург, ул. Краснолесья 24, офис 107
ИНН/КПП 6671140695/667101001
ОГРН 1216600004720
Расчетный счет 40728108040000038411
БИК 046577906
Лицензия № Л041-01021-66/00141701 от 08.04.2022
Телефон: +7 (343) 301-10-10
E-mail: info@rmc-clinic.ru

Дополнительные средства, используемые для подготовки кишечника к исследованию

Хорошо зарекомендовало себя использование пеногасителей - **«Эспумизан»** в комбинации с препаратами для кишечного лаважа. **Эспумизан 30 мг.,** капли, капсулы, эмульсия, суспензия - обеспечивает отсутствие пенистого кишечного секрета в просвете кишки и улучшает визуализацию слизистой.

Прокинетики («Реглан», «Церукал» и др.) вызывают повышение амплитуды сокращений мускулатуры полых органов, ускорению перистальтики тонкой кишки. Применяется в качестве добавки к препаратам для кишечного лаважа, что приводит к снижению тошноты и вздутия.

Комбинирование препаратов для кишечного лаважа («Эндофальк», «Фортранс» либо «Мовипреп») и слабительных препаратов («Сенаде», «Мукофальк», «Пурсеннид», «Регулакс», «Глаксена») приводит к улучшению качества подготовки кишечника. В качестве слабительных используются также препараты «Дульколакс», «Лаксатин», «Лаксбене» и др., в дозировке 10-20мг: 2-4 таблетки вечером, внутрь. Действие наступает в среднем через 6 часов при приеме внутрь в дневное время, и через 8-12 часов при приеме внутрь перед сном.

Для уменьшения вероятности неприятных ощущений вовремя и после осмотра назначается кишечный спазмолитик (препарат снимающий спазм кишки) Дицетел по 50 мг (1 таблетка) 3 раза в день в течении трех дней до исследования и 50 мг непосредственно перед колоноскопией. Но-шпа, баралгин, спазмалгон и другие подобные препараты малоэффективны.