Общество с ограниченной ответственностью"ЭрЭмСи клиника"
Юридический адрес: 620110 г. Екатеринбург, ул. Краснолесья 24, офис 107
ИНН/КПП 6671140695/667101001
ОГРН 1216600004720
Расчетный счет 40728108040000038411
БИК 046577906
Лицензия № Л041-01021-66/00141701 от 08.04.2022
Телефон: +7 (343) 301-10-10
E-mail: info@rmc-clinic.ru

Схема подготовки	Схема приёма препарата
Одноэтапная вечерняя схема (День накануне) До 10.00	С 20:00 до 21:00 развести 1 флакон Эзиклена водой до 500-1000 мл и выпить в течение 1 часа. Затем с 21.00 до 22.00 обязательно дополнительно выпить еще 1 литр воды. С 22.00-23.00 развести 2 флакон Эзиклена водой до 500-1000 мл и выпить в течение 1 часа. Затем с 23.00 обязательно дополнительно выпить еще 1 литр воды, добавив 30 мл эмульсии препарата Эспумизан. Раствор препарата принимать дробно - по 250мл каждые 15 минут. Утром в день исследования за 4-5 часа до исключить прием любой разрешенной жидкости.
Двухэтапная схема (День накануне колоноскопии +день колоноскопии)	С 20:00 до 21:00 развести 1 флакон Эзиклена водой до 500-1000 мл и выпить в течение 1 часа. Затем с 20.00 до 21.00 обязательно дополнительно выпить еще 1 литр воды. В день колоноскопии за 4-5 часов до исследования повторить те же действия со вторым флаконом Эзиклена и 1 литром воды (добавив в нее 30 мл эмульсии препарата Эспумизан). Раствор препарата принимать дробно - по 250мл каждые 15 минут.
Одноэтапная утренняя схема (День колоноскопии) С 12.00	С 04:00 до 05:00 развести 1 флакон Эзиклена водой до 500-1000 мл и выпить в течение 1 часа. Затем с 05.00 до 06.00 обязательно дополнительно выпить еще 1 литр воды. С 06.00 до 07.00 повторить те же действия со вторым флаконом Эзиклена и 1 литром воды (добавив в нее 30 мл эмульсии препарата Эспумизан). Раствор препарата принимать дробно - по 250мл каждые 15 минут.